

คำแนะนำเพิ่มเติม ประโยชน์ และวิธีใช้

## **Paclobutrazol 10 WP**

**ประโยชน์** ใช้ชะลอการเจริญเติบโตทางใบ ออกฤทธิ์  
ตรงข้ามกับจิบเบอเรลลิน โดยยับยั้งการสังเคราะห์  
จิบเบอเรลลิน เพื่อกระตุ้นให้พืชสะสมอาหาร  
พร้อมที่จะออกดอก นิยมใช้ในมะม่วง และมีใช้ใน  
ทุเรียนบ้าง ใช้ในการทำทวายในไม้ผลหลาย ๆ ชนิด เช่น  
มะม่วง ทุเรียน มังคุด มะนาว เป็นต้น

**วิธีใช้** มะม่วงพันธุ์หนัก ใช้อัตรา 15-20 กรัม เส้นผ่า  
ศูนย์กลางต้น 1 เมตร  
มะม่วงพันธุ์เบา ใช้อัตรา 10-15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลางต้น  
1 เมตร ผสมน้ำราดช่วงใบเปสลาด  
หรืออัตรา 30-40 กรัม ผสมน้ำ 4 ลิตร ราดให้ชิดโคนต้น

